



CORONA-IMPfstoffe im Überblick

Grundimmunisierung	Impfempfehlung nach Alter			Impfempfehlung besondere Gruppen				
	12-29 Jahre	30-59 Jahre	> 60 Jahre	Schwangere	Stillende	Menschen mit Immunschwäche	Infizierte/Genesene	
Mögliche Impfstoffe nach STIKO	mRNA Biontech/Pfizer: 2 Dosen, Abstand 3-6 Wochen	mRNA Biontech/Pfizer: 2 Dosen, Abstand 3-6 Wochen	mRNA Biontech/Pfizer: 2 Dosen, Abstand 3-6 Wochen	Ab 2. Trimenon mit mRNA Biontech/Pfizer: 2 Dosen, Abstand 3-6 Wochen Sonderfall: 1. Dosis -> Schwangerschaft -> 2. Dosis ab 2. Trimenon	mRNA Biontech/Pfizer: 2 Dosen, Abstand 3-6 Wochen	12-29 Jahre: mRNA Biontech/Pfizer 2 Dosen, Abstand 3-6 Wochen 3. Dosis (s. Auffrischung)	1. Impfdosis erhalten, danach SARS-CoV2-Infektion: 2. Dosis, Abstand 6 Monate zur Infektion (> 4 Wochen nach Infektion möglich)	
		mRNA Moderna: 2 Dosen, Abstand 4-6 Wochen	mRNA Moderna: 2 Dosen, Abstand 4-6 Wochen			mRNA Moderna: 2 Dosen, Abstand 4-6 Wochen		> 30 Jahre: mRNA Biontech/Pfizer 2 Dosen, Abstand 3-6 Wochen <i>oder</i> mRNA Moderna 2 Dosen, Abstand 4-6 Wochen 3. Dosis (s. Auffrischung)
			Vektorimpfstoff Astra zeneca: STIKO rät: 1. Dosis Astra zeneca; 2. Dosis mRNA, Abstand 4 Wochen Auch möglich: 2 Dosen Astra zeneca, Abstand 9-12 Wochen					Gesicherte Infektion ohne Symptome, Infektzeitpunkt unbekannt: 1 Dosis, Abstand 4 Wochen nach Labordiagnose
			Vektorimpfstoff Johnson&Johnson: Einmaldosis STIKO rät: Auffrischung mit mRNA, Abstand 4 Wochen					
Auffrischung			> 70 Jahre	Pflegebedürftige	Pflege-/Med. Personal mit Patientenkontakt	Menschen mit Immunschwäche (3. Dosis zählt als Grundimmunisierung)	Infizierte/Genesene	
STIKO: möglichst mit gleichem mRNA wie Grundimmunisierung			mRNA Biontech/Pfizer: 1 Dosis, Abstand 6 Monate	mRNA Biontech/Pfizer: 1 Dosis, Abstand 6 Monate	mRNA Biontech/Pfizer: 1 Dosis, Abstand 6 Monate	12-29 Jahre: 3. Dosis mRNA Biontech/Pfizer, Abstand 6 Monate	Immungesund, vollständig geimpft - davor/danach SARS-CoV2-Infektion: KEINE Auffrischung	
Auffrischung nach Grundimmunisierung > 6 Monate für alle möglich; aber Gefährdete (s. rechts) haben Priorität			mRNA Moderna: 0,5 Dosis (= 0,25 ml), Abstand 6 Monate	mRNA Moderna: 0,5 Dosis (= 0,25 ml), Abstand 6 Monate	mRNA Moderna: 0,5 Dosis (= 0,25 ml), Abstand 6 Monate	> 30 Jahre: 3. Dosis mRNA Biontech/Pfizer, Abstand 6 Monate (schwere Immunschwäche: Abstand 4 Wochen) <i>oder</i> 3. Dosis mRNA Moderna, Cave: ganze Dosis = 0,5 ml; Abstand 6 Monate (schwere Immunschwäche: Abstand 4 Wochen)	Johnson&Johnson geimpft, danach SARS-CoV2-Infektion: KEINE Auffrischung	