



IMPF- UND ABRECHNUNGSÜBERBLICK

| „Basisimmunität“ (Grundimmunisierung plus Auffrischimpfung/ Infektion) | Empfohlen für: alle über 18-Jährigen (inkl. Schwangere ab 2. Trimenon); besteht aus 3 Antigenkontakten (2 Impfungen plus Impfung oder Infektion). Bei unvollständiger Basisimmunität erhält die Person die fehlenden Impfstoffdosen, bis mind. 3 Antigenkontakte erreicht sind. Außerdem empfohlen für: Kinder ab sechs Monaten mit Grunderkrankungen (ebenfalls 3 Antigenkontakte); Alterssprechende Kinderdosierungen bis 12 Jahre beachten (s. auch Hinweise)! | Verfügbare Impfstoffe: | Impfschema und Hinweise: | Abrechnungsziffern: |
|--|--|--|--|---------------------------------|
| | | Comirnaty BA.4-5 (15 µg/15 µg) | Zugelassen ab 12 Jahre; Grundimmunisierung: 2 Dosen im Abstand von 3-6 Wochen; Auffrischimpfung 6 Monate später Kinderimpfstoffe verfügbar | 88337+Suffix (A/B/R bzw. V/W/X) |
| | | Comirnaty XBB.1.5 (30 µg); Voraussichtl. bis Ende September als „Impfstoff Nr. 12“ im PVS-System | Zugelassen ab 12 Jahre; Grundimmunisierung: 2 Dosen im Abstand von 3-6 Wochen; Auffrischimpfung 6 Monate später Kinderimpfstoffe demnächst verfügbar | 88342+Suffix (A/B/R bzw. V/W/X) |
| | | Spikevax XBB.1.5 | Zugelassen ab 6 Monaten; Grundimmunisierung 2 Dosen im Abstand 4-6 Wochen; Auffrischimpfung 6 Monate später; Cave (STIKO): Spikevax-Produkte i.d.R. erst ab 30 Jahre | noch keine Angabe |
| | | Johnson & Johnson | Cave (STIKO): Nur für Ü60! Grundimmunisierung: 1 Dosis + 1 Dosis mRNA-Vakzine oder Nuvaxovid; Auffrischimpfung (angepasste mRNA-Vakzine präferiert) 6 Monate später | 88334+Suffix (A/B/R bzw. V/W/X) |
| | | Valneva | Cave: Nur für 18-50 Jahre! Grundimmunisierung: 2 Dosen im Abstand von mind. 4 Wochen, Auffrischimpfung (angepasste mRNA-Vakzine präferiert) 6 Monate später | 88336+Suffix (A/B/R bzw. V/W/X) |
| | | Nuvaxovid | Cave: Nicht bei Schwangeren und Stillenden! Zugelassen ab 12 Jahre; Grundimmunisierung: 2 Dosen im Abstand von mind. 3 Wochen; Auffrischimpfung (angepasste mRNA-Vakzine präferiert) 6 Monate später | 88335+Suffix (A/B/R bzw. V/W/X) |
| Weitere Auffrischimpfungen | Empfohlen für: • über 60-Jährige, • Personen ab sechs Monaten mit Grunderkrankung, • Bewohner von Pflegeeinrichtungen, • medizinisches Fachpersonal, • Familienangehörige und enge Kontaktpersonen von Menschen mit Immunschwäche. | Verfügbare Impfstoffe: | Impfschema und Hinweise: | Abrechnungsziffern: |
| | | | STIKO empfiehlt Varianten-adaptierte Impfstoffe. Eventuelle Kinderdosierungen beachten! Mindestabstand von 12 Monaten zur vorherigen Antigenexposition beachten, Vorzugsweise im Herbst impfen. | |
| | | Comirnaty BA.1 | Zugelassen ab 12 Jahre | 88340 + Suffix R bzw. X |
| | | Comirnaty BA.4-5 (15 µg/15 µg) | Zugelassen ab 12 Jahre Kinderimpfstoffe verfügbar | 88337 + Suffix R bzw. X |
| | | Comirnaty XBB.1.5 (30 µg) | Zugelassen ab 12 Jahre Kinderimpfstoffe demnächst verfügbar | 88342 + Suffix R bzw. X |
| | | Spikevax BA.4-5 | Zugelassen ab 6 Jahre Cave (STIKO): Spikevax-Produkte i.d.R. erst ab 30 Jahre | 88338 + Suffix R bzw. X |
| | | Spikevax XBB.1.5 | Zugelassen ab 6 Monaten Cave (STIKO): Spikevax-Produkte i.d.R. erst ab 30 Jahre | noch keine Angabe |
| | | Nuvaxovid evtl. nach Zulassung demnächst auch Nuvaxovid XBB.1.5 | Zugelassen ab 12 Jahre | 88335 + Suffix R bzw. X |
| | | VidPrevtyn Beta | Cave: Erst ab 18 Jahre zugelassen! | 88339 + Suffix R bzw. X |

Stand: 5.10.2023

Erstellt von: Anne Bäurle

Quellen: KBV, PEI, RKI

Anm. d. Red.: Die Impfstoffe Comirnaty und Spikevax der ersten Generation sowie Spikevax BA.1 sind mittlerweile nicht mehr verfügbar und deshalb nicht gelistet. Die Impfstoffe Valneva und Bimervax für Auffrischimpfungen wurden nicht in die Liste aufgenommen, da für sie keine Abrechnungsziffern existieren.

Indikation allgemein: A=1. Dosis, B=2. Dosis, R= ab 3. Dosis; Indikation beruflich: V=1. Dosis, W=2. Dosis, X= ab 3. Dosis



Institut für Hausärztliche Fortbildung

