Spicker Blankoverordnung Heilmittel

Spickzettel-Updates unter www.hausarzt.link/blanko-spicker



erstellt von den *Rauchenden Köpfen*: Dr. Christoph Claus, Dr. Sabine Frohnes, Moritz Eckert und Timo Schumacher Stand: 21.10.2025 (ohne Gewähr)



www.hausaerztlichepraxis.digital

Blankoverordnung Physiotherapie

- 16 Wochen gültig
- Physio legt Anzahl, Frequenz, Therapieform fest, trägt wirtschaftliche Verantwortung ("nicht heilmittelbudgetrelevant")

• bei Erkrankungen der Schulter, z. B.

- □ M75.0 Frozen Shoulder
- □ M75.1 Rotatorenmanschettenläsion
- □ M75.4 Impingment d. Schulter
- □ M75.5 Bursitis (Schulterregion)
- □ M75.9 Schulterläsion, n.n.bez.
- □ M71.91 Bursopathie, n.n.bez. (Schulterregion)
- □ **M65.91** Synovitis/Tenosynovitis, n.n.bez. (Schulterregion)
- □ **M24.91** Gelenkschädigung, n.n.bez. (Schulterregion)
- □ M19.91 Arthrose, n.n.bez. (Schulterregion)
- □ M13.91 Arthritis, n.n.bez. (Schulterregion)
- □ **\$43.-** Luxation, Verstauchung, Zerrung (Gelenke, Bänder d. Schulter)
- □ **\$49.9** Verletzung Schulter u. Oberarm, n.n.bez.
- □ **\$42.9** Fraktur Schultergürtel, n.n.bez.
- Vollständige Liste: www.hausarzt.link/jvQ7E

Blankoverordnung Ergotherapie

- 16 Wochen gültig
- Ergotherapiepraxis legt Anzahl, Frequenz, Therapieform fest, trägt wirtschaftliche Verantwortung ("nicht heilmittelbudgetrelevant")
- Möglich bei Indikationsschlüssel:

SB 1 (Störungsbild) Erkrankungen der Wirbelsäule, Gelenke, Extremitäten mit motorisch-funktionellen Schädigungen **PS 3** (psychische Störung) wahnhafte und affektive Störungen, Abhängigkeitserkrankungen

PS 4 dementielle Erkrankungen

Lymphdrainage-Verordnung ohne Zeitangabe

- Wer das Ödemstadium per ICD kodiert, kann Lymphdrainage ohne Zeitangabe verschreiben (häufige ICD zeigt Tab. 1)
- Lymphdrainage gilt bei Lymphödem ab Stadium II als besonderer Verordnungsbedarf und bei Lipödem ab Stadium I als langfristiger Heilmittelbedarf. Letzteres aber nur in Zusammenhang mit komplexerer physikalischer Entstauungstherapie, befristet bis Ende 2025.

Tab. 1: Häufige ICD bei Lymph- und Lipödem

	Stadium I	Stadium II	Stadium III
Lipödem	E88.20	E88.21	E88.22
Lymphödem nach Lokalisation:			
obere/untere Extremität	189.00	189.01	189.02
sonstige Lokalisation	189.03	189.04	189.05
Lymphödem nach medizinischen Maßnahmen:			
nach (partieller) Mastektomie (mit Lymphadenektomie)	197.20	197.21	197.22
nach med. Maßnahmen am axilliären Lymphabflussgebiet	197.81	197.82	197.83
nach med. Maßnahmen am inguinalen Lymphabflussgebiet	197.84	197.85	197.86
Hereditäre Lymphödeme:			
obere und untere Extremität	Q82.00	Q82.01	Q82.02
sonstige Lokalisation	Q82.03	Q82.04	Q82.05

■ Besonderer Verordnungsbedarf

Langfristiger Heilmittelbedarf

Quelle: gesund.bund, GKV-Spitzenverband, KBV

Tab. 2: Definition Lymphödem und Lipödem

Lymphödem		
Stadium 0	subklinische Erkrankung, Lymphabfluss gestört, kein sichtbares Ödem	
Stadium I	Ansammlung Flüssigkeit mit viel Protein, verschwindet beim Hochlagern der Extremität; ggf. eindrückbares Ödem	
Stadium II	Ödem verschwindet durch Hochlagern meist nicht vollständig; Anreicherung von Fett- und Bindegewebe; Ödem im Verlauf nicht mehr eindrückbar	
Stadium III	Ödem nicht eindrückbar; trophische Hautveränderungen	
Lipödem		
Stadium I	Verdickte Unterhaut, weich, mit kleinen palpablen Knötchen, Hautoberfläche glatt	
Stadium II	Verdickte Unterhaut, weich, teils größere Knoten subkutan, Hautoberfläche uneben	
Stadium III	Verdickte Unterhaut, induriert, große Knoten, deformierende Wammenbildung	